

2021 初级护师考试考前最后冲刺模拟题

1、治疗洋地黄中毒引起的室性期前收缩宜选用的药物是？

- A. 普罗帕酮
- B. 普萘洛尔
- C. 苯妥英钠
- D. 维拉帕米
- E. 利多卡因

【正确答案】C

【答案解析】洋地黄中毒引起的室性期前收缩应立即停用洋地黄，并给予钾盐和苯妥英钠治疗。

2、患儿女，6岁，不规则中等度发热，乏力，食欲差1月余。查体：消瘦。T38℃；肝肋下3cm，脾肋下2cm。X线胸片：双肺广泛分布“粟粒大小”的结节状阴影，伴右肺刁影扩大。最可能的诊断是？

- A. 粟粒型肺结核
- B. 原发型肺结核
- C. 小叶性干酪型肺炎
- D. 粟粒型肺结核+干酪型肺炎
- E. 原发型肺结核+粟粒型肺结核

【正确答案】A

【答案解析】急性粟粒型肺结核突出的表现有X线双肺分布“粟粒大小”的结节状阴影。

3、关于急性颅内压增高患儿的临床表现，正确的叙述是？

- A. 晨起头痛较轻
- B. 婴儿发病早期头痛明显
- C. 早期表现为血压降低，继而脉率增快
- D. 晨起呕吐不明显
- E. 上丘受压可产生落日眼

【正确答案】E

【答案解析】一般晨起头痛较重，婴儿因囟门未闭，对颅内高压有一定缓冲作用，故早期头痛不明显，仅有前凶紧张或隆起，早期表现为血压升高，继而脉率减慢，呼吸开始时增快，严重时呼吸慢而不规则，甚至暂停。呕吐频繁，晨起明显，上丘受压可产生上视受累（落日眼）。

4、应立即收治ICU的是？

- A. 肾挫伤患者
- B. 冠心病患者
- C. 呼吸衰竭患者
- D. 轻度脱水患者
- E. 阑尾切除术后患者

【正确答案】C

【答案解析】呼吸衰竭患者需要严密监测呼吸功能应立即收治ICU。

5、治疗休克的基本措施是？

- A. 治疗原发病
- B. 补充血容量
- C. 应用血管活性药物

- D. 纠正代谢紊乱
- E. 增强心功能

【正确答案】B

【答案解析】各类休克都存在有效循环血量的绝对不足或相对不足，补充血容量是治疗休克的最基本措施，处理原发病是治疗休克的前提。

6、患儿女，7个月。因“反复发作性抽搐2天”就诊。足月顺产，人工喂养，户外活动少，最可能的诊断是？

- A. 维生素D缺乏性佝偻病
- B. 原发性癫痫
- C. 缺氧缺血性病
- D. 颅内感染
- E. 维生素D缺乏性手足搐搦症

【正确答案】E

【答案解析】维生素D缺乏性手足搐搦症典型的临床表现为惊厥、手足抽搐、喉痉挛发作，常伴有烦躁、睡眠不安、易惊、夜啼、多汗等症状。该题患儿反复发作性抽搐，人工喂养，户外活动少可判断为维生素D缺乏性手足搐搦症

7、风湿热的主要表现不包括？

- A. 心脏炎
- B. 环形红斑
- C. 舞蹈病
- D. 关节畸形
- E. 多发性关节炎

【正确答案】D

【答案解析】风湿热所致关节炎伴红肿热，但预后好，无关节破坏。

8、患者男，50岁，肝硬化病史10年，半年前曾有上消化道出血史。1天前出现黑便，下列护理措施错误的是？

- A. 饮食温度要低
- B. 不进食粗糙、刺激性食物
- C. 口服药物应研磨成粉冲服
- D. 一般不放置胃管
- E. 避免咳嗽，长做屏气锻炼

【正确答案】E

【答案解析】消化道出血可以进食清淡、富有营养的温凉饮食，避免刺激性食物。但是无需避免咳嗽，长做屏气锻炼。

9、治疗急性肺水肿不恰当的措施是？

- A. 取坐位，两腿下垂
- B. 口服地高辛
- C. 高流量吸氧
- D. 静滴氨茶碱
- E. 皮下注射吗啡

【正确答案】B

【答案解析】急性肺水肿应该是静推西地兰，而不是“口服”地高辛。

10、关于新生儿坏死性小肠结肠炎的临床表现，不正确的叙述是？

- A. 常有窒息史

- B. 以腹痛起病
- C. 腹胀
- D. 呕吐
- E. 便血

【正确答案】A

【答案解析】坏死性小肠结肠炎常以急性腹痛起病，呕吐、腹泻、血便为主要临床表现，腹部X线平片以动力性肠梗阻、肠壁积气和门静脉积气为特征。

11、器械护士和巡回护士的共同责任是？

- A. 静脉输液
- B. 管理器械台
- C. 传递器械
- D. 核对病人姓名
- E. 清点器械、敷料

【正确答案】E

【答案解析】术前和术中关体腔前和缝合切口前，与巡回护士共同准确清点各种器械、敷料、缝针等的数目，核实后登记。术毕再自行清点一次，以防遗留在手术区内。

12、某患者患肺结核病一年，现仍有热、咳嗽、咯血等症状。为明确病因，相关的辅助检查是？

- A. CT
- B. 磁共振
- C. X线胸片
- D. 结核菌素试验
- E. B超

【正确答案】D

【答案解析】结核菌素试验可测定人体是否受过结核菌感染。

13、清创术的最佳时机是伤后？

- A. 6~8小时内
- B. 8~10小时内
- C. 10~12小时内
- D. 24小时内
- E. 48小时内

【正确答案】A

【答案解析】清创最好在伤后6~8小时内施行，这是手术的最佳时机。

14、食管癌中期的典型症状是

- A. 进行性厌食
- B. 进食时易哽噎
- C. 胸骨后灼烧感
- D. 胸痛，声音嘶哑
- E. 进行性吞咽困难

【正确答案】E

【答案解析】食管癌进展期典型症状为进行性吞咽困难，先是难以咽干硬食物，继而只能进半流食、流食，最后滴水难进。

15、关于全胃肠道外营养的护理要点，下列哪项不正确

- A. 一切操作必须严格无菌

地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座北配楼

电话：010-88820136 传真：010-88820119 网址：www.wendu.com

- B. 可存放 48h 以上
- c. 营养液可暂存于 4℃ 以下冰箱内
- D. 不可在此静脉处采血、给药等
- E. 每隔 24~48h 在无菌操作于更换与静脉导管相接的输液管及输液瓶一次

【正确答案】B

【答案解析】营养液在无菌环境下配制，并于 24h 内用完。

16、胆总管内放置“T”形管的目的是

- A. 减少毒素吸收
- B. 减轻膨胀
- C. 止痛
- D. 减少胆汁分泌
- E. 引流胆汁进入肠道或分流至体外

【正确答案】E

【答案解析】引流胆汁以减轻胆汁对胆管的损伤作用，促进胆管炎症消退。

17、新生儿硬肿症时患儿最先出现硬肿的部位是

- A. 脸颊
- B. 上肢
- C. 臀部
- D. 大腿
- E. 小腿

【正确答案】E

【答案解析】新生儿硬肿症硬肿发生的顺序为：小腿-大腿外侧-整个下肢-臀部-面颊-上肢-全身。

18、指导患者正确服用硝酸甘油以缓解心绞痛的方法是

- A. 药物置于口中，立即用温开水送服
- B. 舌下含药时应平卧或坐稳，以防发生低血压
- c. 如果 30 分钟后不缓解，再服一片
- D. 观察头晕、血压升高的表现
- E. 因药物在舌下被唾液溶解而减少吸收

【正确答案】B

【答案解析】硝酸甘油可扩张外周血管，故舌下含服硝酸甘油时应平卧或坐稳，以防发生低血压。

19、患者，女，40 岁。因重度甲亢经手术治疗痊愈，护士对其出院进行的健康指导中不妥的是

- A. 术后半个月可恢复正常工作
- B. 注意有无甲亢复发病状
- C. 避免劳累，保持心情愉快
- D. 做抬头、左右转颈活动
- E. 注意有无甲状腺功能低下症状

【正确答案】A

【答案解析】应避免劳累，有充足的休息时间，避免复发。

20、早期先兆流产最早出现的症状是

- A. 子宫停止增大
- B. 尿妊娠试验阴性

- C. 持续性腹痛
- D. 少量阴道出血
- E. 宫口扩张

【正确答案】D

【答案解析】先兆流产表现为停经后先出现少量阴道流血，量比月经少，有时伴有下腹痛，腰痛。

21、患者，女，60岁。近一段时间常感到下腹部一侧胀痛，有压迫感。妇科检查中可触及子宫一侧的实性包块，表面不平，结节状，与周围组织有粘连，并伴有消瘦，贫血、水肿。可考虑为

- A. 子宫肌瘤
- B. 良性卵巢肿瘤
- C. 恶性卵巢肿瘤早期
- D. 恶性卵巢肿瘤晚期
- E. 子宫内膜异位症

【正确答案】D

【答案解析】恶性卵巢肿瘤早期常无症状，一旦出现腹胀症状或发现腹部肿块时疾病已至晚期。晚期时肿瘤广泛转移，患者可有腹痛、腰痛或下腹疼痛。末期患者出现明显消瘦、贫血、水肿、衰竭等恶病质表现。

22、患者，男，68岁。先是夜间尿频，后逐步排尿时间延长，尿不净，今下午排不出尿，小腹胀痛来院就诊。护士首先应如何处理

- A. 穿刺抽尿
- B. 膀胱造瘘
- C. 导尿并留置导尿管
- D. 压腹部排尿
- E. 急诊做前列腺摘除术

【正确答案】C

【答案解析】该患者为典型的前列腺增生症状，目前出现了急性尿潴留，应当立即导尿解除尿潴留。由于患者的膀胱平滑肌收缩无力，应当留置尿管，以防再次出现尿潴留。

(23~25 题共用题干)

患者，女，80岁。肺心病，近半个月来咳嗽、咳痰，今晨呼吸困难加重，烦躁不安，神志恍惚。查体：体温 36.4℃，脉搏 120 次/分，呼吸 38 次/分，口唇发绀，两肺底闻及湿啰音，血压正常。

23. 患者最可能出现的并发症是

- A. 心力衰竭
- B. 上消化道出血
- C. 急性肾衰竭
- D. 呼吸衰竭
- E. DIC

24. 该患者适宜的体位是

- A. 仰卧位
- B. 侧卧位
- C. 头高足低位
- D. 半坐卧位
- E. 俯卧位

25. 对患者进行吸氧，下列正确的是

- A. 间断吸氧
- B. 低流量吸氧
- C. 高流量吸氧
- D. 高浓度吸氧
- E. 无需湿化吸氧

【正确答案】D、D、B

【答案解析】23 题考核了呼吸衰竭的临床表现，有呼吸困难、发绀、精神症状等，且患者若为肺心病。24 题考核了肺源性呼吸困难的护理措施，严重呼吸困难者应取半坐卧位或端坐位。25 题考核了肺心病的吸氧方法。应为持续低流量吸氧。

(26~30 题共用备选答案)

- A. 不需要特殊处理
- B. 立即行清宫手术
- C. 卧床休息，禁止性生活
- D. 及时促使胎儿和胎盘排出，处理前需要做凝血功能检查
- E. 尽早使胚胎及胎盘完全排出

26. 先兆流产的处理

27. 难免流产的处理

28. 不全流产的处理

29. 完全流产的处理

30. 稽留流产的处理

【正确答案】C、E、B、A、D

【答案解析】先兆流产的处理原则是卧床休息，禁止性生活，减少刺激。难免流产的处理原则是一旦确诊，尽早使胚胎及胎盘完全排出。不全流产的处理原则是一经确诊，应行吸宫术或钳刮术以清除宫腔内残留组织。完全流产的处理原则是如果无感染征象，一般不需要特殊处理。稽留流产的处理原则是应及时促使胎儿和胎盘排出，处理前应做凝血功能检查。

31. 在收集资料过程中，不属于客观资料的选项是

- A. 患者体温 37.5℃
- B. 血红蛋白 70g/L
- C. 二尖瓣杂音
- D. 头痛剧烈
- E. 体重 58kg

【正确答案】D

【答案解析】客观资料是护士通过观察、体检或借助诊断仪器和实验室检查获得的资料，如“患者体温 37.5℃”“血红蛋白 70g/L”。

32. 低盐饮食，限制成人进食盐量为

- A. <2g/d
- B. ≤2g/d
- C. ≥2g/d
- D. <0.8g/d
- E. >0.8g/d

【正确答案】A

【答案解析】低盐饮食，限制成人进食盐量为<2 g/d，其中，含钠 0.8g 或酱油 10ml/d，但不包括食物内自然含的氯化钠。

33、用氧的指标是机体动脉血氧分压低于

- A. 6.67mmHg
- B. 667kPa
- C. 6.67kPa
- D. 66.7kPa
- E. 0.667kPa

【正确答案】C

【答案解析】当患者出现中度缺氧情况时可采用氧气吸入，中度缺氧是指氧分压为4~6.67kPa，即当氧分压低于6.67kPa时需要给氧。

34、静脉注射过程中，如发现患者局部肿胀、疼痛、试抽有回血，可能的原因是

- A. 静脉痉挛
- B. 针头阻塞
- C. 针头斜面一半在血管外
- D. 针头斜面紧贴血管内壁
- E. 针头刺入皮下

【正确答案】C

【答案解析】静脉注射过程中，试抽有回血，说明针头斜面在血管内；另外患者局部肿胀、疼痛，说明部分药液溢出血管外，故可能的原因是针头斜面一半在血管外。

35、低蛋白饮食可用于

- A. 尿毒症、肝性脑病
- B. 高血压、心脏病
- C. 高脂血症
- D. 先兆子痫
- E. 恶性肿瘤

【正确答案】A

【答案解析】尿毒症、肝性脑病应低蛋白饮食。

36、口服洗胃法，适宜洗胃液的量、温度分别是

- A. 5000~10000ml、20~28℃
- B. 1000~20000ml、20~28℃
- C. 20000~30000ml、20~28℃
- D. 10000~20000ml、25~38℃
- E. 5000~10000ml、25~38℃

【正确答案】D

【答案解析】口服洗胃时，一次洗胃液的总量以10000~20000ml为宜，温度为25~38℃。

37、患者，男，32岁。体温在39℃以上，但波动幅度大，24小时温差在1℃以上，最低体温仍高于正常水平，常见于败血症，热型属于

- A. 弛张热
- B. 稽留热
- C. 不规则热
- D. 间歇热
- E. 回归热

【正确答案】A

【答案解析】弛张热是指体温在39℃以上，但波动幅度大，24小时体温差在1℃以上，最低体温仍高于正常水平，常见于败血症、风湿热等。

38、患者，女，40岁。子宫全切术后4天，腹部胀痛难忍，腹部叩诊为鼓音，护士遵医嘱为其行肛管排气时见排气不畅，护士可

- A. 更换肛管重插
- B. 帮助病员转换体位
- C. 嘱病员屏气，增加腹压
- D. 增加肛管插入深度至22cm
- E. 嘱病人保留肛管1小时

【正确答案】B

【答案解析】肛管排气时如排气不畅可帮助病人更换体位，或者按摩腹部以促进排气。

(39~40题共用题干)

患者，女，55岁。脑出血昏迷1年，每日给予鼻饲、翻身等处理，眼睑不能闭合，有尿失禁，已留置尿管。

39. 为保护患者的眼睛，应

- A. 予以暴露
- B. 干纱布覆盖
- C. 湿纱布覆盖
- D. 油纱布覆盖
- E. 按揉到闭合

40. 保护双眼的目的是预防

- A. 外伤
- B. 倒睫
- C. 角膜溃疡
- D. 睑腺炎(麦粒肿)
- E. 睫状体炎

【正确答案】D、C

【答案解析】对于眼睑不能自行闭合者，使用油纱布覆盖眼睛，有助于保护角膜，防止角膜干燥而致结膜炎或溃疡。

(41~42题共用题干)

患者，男，58岁。慢性肾小球肾炎10余年，近日因上呼吸道感染诱发水肿加重、血压升高入院治疗，遵医嘱给予静脉滴注白蛋白液。

41. 对该患者给予白蛋白输注的目的是

- A. 增强机体免疫能力
- B. 维持胶体渗透压
- C. 补充血容量
- D. 调节血管张力
- E. 改善肾脏血液循环

42. 护士操作以下不妥的是

- A. 选择远端小静脉开始穿刺
- B. 避免在水肿明显处进针
- C. 溶液温度较低时可适度加温
- D. 溶液内不宜加入药物
- E. 滴注完毕冲入少量生理盐水

【正确答案】B、C

【答案解析】该患者静滴白蛋白液，可以维持胶体渗透压，减轻组织渗出和水肿。白蛋白液

不能加温，以免蛋白凝固变性而引起反应。

(43~46 题共用备选答案)

- A. 50g/d
- B. 300mg/d
- C. 4g/d
- D. 40g/d
- E. 0.5g/d

- 43. 低钠饮食需控制食物中的含钠量少于
- 44. 低胆固醇饮食胆固醇摄入量应不超过
- 45. 低脂饮食脂肪的摄入量应不超过
- 46. 肌酐试验饮食期间蛋白质供给应不超过

【正确答案】E、B、A、D

【答案解析】低钠饮食需控制食物中的含钠量少于 0.5 g/d，低胆固醇饮食胆固醇摄入量小于 300mg/d，低脂饮食脂肪的摄入量小于 50g/d，肌酐试验饮食期间蛋白质供应不超过 40g/d。

(47~49 题共用备选答案)

- A. 更换针头重新穿刺
 - B. 适当提高输液瓶位置
 - C. 调整针头位置
 - D. 热敷注射部位上端血管
 - E. 适当降低患者肢体位置
- 47. 静脉痉挛的处理措施为
 - 48. 针头斜面紧贴血管壁导致溶液滴注不畅应
 - 49. 挤压近针头端的输液管，有阻力，无回血应

【正确答案】D、C、A

【答案解析】发生静脉痉挛时，用热水袋或热毛巾热敷注射部位上端血管，以缓解静脉痉挛。针头斜面紧贴血管壁，妨碍液体滴入，可调整针头位置或适当变换肢体位置，直到滴注通畅为止。折叠滴管下输液管，同时挤压近针头端的输液管，若感觉有阻力，且无回血，则表示针头已阻塞，应更换针头重新穿刺。