

## 2021 年临床执业/助理医师“一年两试”速记考点

- 26.鉴别室速与阵发性室上速最有力的证据是：是否存在房室分离。
- 27.最容易发生房室传导阻滞的是：急性下壁心肌梗死。
- 28.法洛三联症最早出现的临床表现是：口唇青紫。
- 29.口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血患者，最先上升的是：网织红细胞。
- 30.慢性胃溃疡最常见的并发症是：出血。
- 31.左心衰竭最早出现的症状是：劳力性呼吸困难。
- 32.最可能发生晕厥的心脏瓣膜病是：主动脉瓣狭窄。
- 33.水痘最常见的并发症是：继发皮肤细菌感染。
- 34.维生素 D 缺乏性佝偻病最早出现的骨骼改变是：颅骨软化。
- 35.导致肺水肿最直接的原因是：肺静脉压升高。
- 36.蛋白质-能量营养不良最早出现的症状是：体重不增。
- 37.对鉴别肾小球源性血尿最有意义的是：变形红细胞血尿。
- 38.胸骨右缘第二肋间触及收缩震颤，最常见于：主动脉瓣狭窄。
- 39.心尖部触及舒张期震颤最常见于：二尖瓣狭窄。
- 40.最常出现 ANCA（抗中性粒细胞胞质抗体）阳性的肾病是：急进性肾小球肾炎（III型）。
- 41.梨形心最常见于：二尖瓣狭窄。
- 42.最可能引起左心室前负荷增加的是：主动脉瓣关闭不全。
- 43.能最显著地促进胰岛素分泌的激素是：抑胃肽。
- 44.传播病毒危险性最大的血液成分是：白细胞。
- 45.肝硬化门静脉高压症最具诊断价值的表现是：食管下段、胃底静脉曲张。
- 46.心动周期中，室内压升高速率最快的时相是：等容收缩期。
- 47.在安静的状态下，人体调节产热活动最重要的因素是：甲状腺激素。
- 48.急性失血时最先出现的调节反应是：交感神经兴奋。
- 49.在神经纤维动作电位的去极相，通透性最大的离子是：Na<sup>+</sup>。
- 50.血浆蛋白质中含量最多的是：清（白）蛋白。
- 51.在血浆蛋白电泳中泳动最慢的蛋白质是：γ-球蛋白。