

2021 年临床执业/助理医师“一年两试”速记考点

- 151.难以鉴别的肾癌和肾囊肿，最可靠的鉴别方法是：CT。
- 152.确诊高功能性甲状腺结节，最有意义的检查是：放射性核素扫描。
- 153.胫骨下 1 / 3 骨折最常见的并发症是：骨折延迟愈合。
- 154.腹外疝最易嵌顿的是：股疝。
- 155.治疗急性梗阻性化脓性胆管炎最常用的有效手术方式是：胆总管切开、T 管引流术。
- 156.急性重症胆管炎并发休克，最重要的治疗措施是：解除胆道梗阻，通畅引流。
- 157.后纵隔肿瘤最常见的是：神经源性肿瘤。
- 158.低钾血症时，最早出现的临床表现是：肌无力。
- 159.临床上最为常用的血液制品是：红细胞悬液（添加剂红细胞）。
- 160.近年来临床输血中细菌污染反应增多的最主要原因是：血小板在体外保存于室温，细菌相对容易生长繁殖。
- 161.外科患者最易发生水和钠代谢紊乱的是：等渗性缺水。
- 162.在中国，急性胰腺炎最常见的发病因素是：胆道结石病。
- 163.膀胱癌在病理上最重要的是：浸润深度。
- 164.疑为骨盆骨折的患者来院急诊，最首要的检查应是：X 线片。
- 165.硫酸镁中毒时最早出现的是：膝反射消失。
- 166.外阴部外伤后最易发生血肿的部位是：大阴唇。
- 167.最常见于幼女和少女的卵巢肿瘤是：内胚窦瘤（卵黄囊瘤）。
- 168.子宫内膜结核最可靠的诊断依据是：子宫内膜病理活检。
- 169.与病理缩复环关系最密切的是：嵌顿性肩先露。
- 170.子宫内膜癌最多见的病理类型是：腺癌。
- 171.近年女性生殖系统恶性肿瘤中死亡率最高的是：卵巢癌。
- 172.最常见的子宫肌瘤类型是：肌壁间肌瘤。
- 173.最适于进行输卵管结扎术的时间是：月经后 3~4 天。
- 174.治疗滴虫性阴道炎的药物是：甲硝唑。
- 175.侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是：活组织镜下见有无绒毛结构。