

2021 年临床执业/助理医师“一年两试”速记考点

- 176.心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时期是：妊娠 32~34 周。
- 177.胎头于临产后迟迟不入盆，骨盆测量径线最有价值的是：骶耻外径。
- 178.最常见的子宫内膜异位症病灶部位在：卵巢、宫骶韧带。
- 179.最常见的卵巢肿瘤并发症是：蒂扭转。
- 180.诊断子宫内膜癌最可靠的方法是：分段诊刮。
- 181.宫颈癌最常见的病理类型是：鳞状细胞癌。
- 182.普查宫颈癌时最有实用价值的检查方法是：宫颈刮片细胞学检查。
- 183.绒癌最常见的转移部位是：肺部。
- 184.确定胎儿安危最简便而较准确的方法是：胎动计数。
- 185.对放射治疗最敏感的卵巢恶性肿瘤是：无性细胞瘤。
- 186.麻疹早期诊断最有意义的临床表现是：Koplik 斑（麻疹黏膜斑）。
- 187.营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少或消失，最后累及的部位是：面颊部。
- 188.缺铁性贫血早期最可靠的依据是：血清铁蛋白降低。
- 189.新生儿溶血病最常见的是：ABO 血型不合。
- 190.造成先天性甲状腺功能低下的最主要的原因是：甲状腺不发育或发育不全。
- 191.诊断急进性肾小球肾炎最有价值的指标是：50%以上肾小球囊内有新月体形成。
- 192.消除支气管哮喘气道炎症最有效的药物是：糖皮质激素。
- 193.两组呈正态分布的数值变量资料，但均数相差悬殊，若比较离散趋势，最好选用的指标为：变异系数。
- 194.正态分布的数值变量资料，描述离散趋势的指标最好选用：标准差。
- 195.对慢性疾病进行现况调查，最适宜计算的指标为：患病率。
- 196.医生在与慢性病患者的交往中，医患关系中最理想的模式是：共同参与型。
- 197.脱敏治疗的最佳适应证为：恐怖症。
- 198.最先提出不伤害原则的西方医学家是：希波克拉底。
- 199.医学伦理学中最古老、最有生命力的医德范畴是：医疗保密。
- 200.急性呼吸衰竭最基本、最重要的治疗措施是：保持呼吸道通畅。