

医学考试必考

临床 每日知识点

心血管系统高频考点

1. 下肢静脉曲张病人手术前应做的深静脉通畅试验称为——Perthes 试验。

2. 以缺血性静息痛为主要症状时,提示血栓闭塞性脉管炎的分期是——Ⅲ期。

3. 引起单纯性下肢静脉曲张的主要原因是——静脉壁薄弱和静脉内压持续升高。

4. (对比记忆)

(1)哮喘患者最不宜选用的降压药为—— β 受体阻滞剂。

(2)妊娠患者最不宜选用的降压药为——血管紧张素转换酶抑制剂。

5. (对比记忆)

(1)高血压性脑出血的常见病变部位在——基底节。

(2)癫痫复杂部分性发作的病灶多位于——颞叶。

6. (对比记忆)

(1)冠心病稳定型心绞痛合并高血压首选——钙通道阻滞剂。

(2)糖尿病肾病合并高血压首选——血管紧张素 II 受体阻滞剂。

7. (对比记忆)

(1)心源性休克表现为——中心静脉压高,血压低。

(2)严重血容量不足表现为——中心静脉压低,血压低。

8. (对比记忆)

(1)急性心肌梗死,肺部有湿啰音,但啰音范围小于 1/2 肺野,判断为——Killip II 级。

(2)风湿性心脏病,休息时有心悸,呼吸困难或心绞痛,任何活动均可加重上述症状。

判断为——NYHA IV 级。

9. (对比记忆)


(1)高血压伴支气管哮喘患者禁用——美托洛尔。

(2)高血压伴高钾血症患者禁用——螺内酯。

10. (对比记忆)

(1)最易引起低钾血症的降压药是——氢氯噻嗪。

(2)最易引起干咳的降压药是——卡托普利。



立即扫码
获取更多医考资讯