


医学考试必考

口腔 每日知识点

第四部分口腔临床医学综合

口腔黏膜病学

- 1.正常人的张口度大小约相当于自身的示、中、无名三指合拢时三指末节的宽度。正常张口度为3.7~5.0cm。
①轻度张口受限指上下中切牙的切缘间之距离为2.0cm~2.5cm，约两横指宽。
②中度张口受限指上下中切牙的切缘间之距离为1.0cm~2.0cm，一横指宽。
③重度张口受限指上下中切牙的切缘间之距离为不足一横指，小于1.0cm。
④完全性张口受限指牙关紧闭；大于5.0cm则称为开口过大。
- 2.腮腺触诊一般以示、中、无名三指平触为宜，切忌用手指提拉触摸。下颌下腺和舌下腺的触诊则常用双手合诊法检查。对有狭窄的涎腺导管的检查可采用探诊的方法，探针应钝而细。
- 3.高压蒸汽灭菌适用于一般器械、布类、纱布、棉花类及橡胶类等均可使用。（口诀：棉胶纱布）
- 4.煮沸消毒法可使刀刃的锋利性受损。对于肝炎患者污染的器械与物品，应煮沸30分钟。加入2%碳酸氢钠时，沸点即达105℃。
- 5.干热灭菌法适用于玻璃、陶瓷、明胶海绵、凡士林、油脂、液体石蜡和各种粉剂等物品。一般160℃应持续120分钟，170℃应持续90分钟，180℃应持续60分钟。（口诀：明胶玻璃陶，蜡油林干热）。



扫码并关注
获取更全面的医考资讯