

医学考试必考


口腔 每日知识点

第四部分口腔临床医学综合

口腔颌面外科学



- 1.碘酊消毒颌面颈部为2%，口腔内为1%，头皮部为3%。消毒皮肤时，应待其干燥后，用70%乙醇脱碘，碘过敏者忌用。
- 2.缝合的原则是在彻底止血的基础上，自深而浅逐层进行严密而正确的对位缝合，以期达到一期愈合的目的。缝合的基本要求是两侧组织应该等量、对称；应在无张力或最小张力下进行；缝合顺序应是先游离侧，后固定侧，相反则易撕裂组织；切口两侧进出针间距大于皮下间距，易造成皮肤创缘内卷；相反，进出针间距小于皮下间距则皮肤创缘呈现过度外翻。
- 3.一般整复手术以缝合边距2~3mm、针距为3~5mm，颈部手术缝合边距为3mm、针距5mm为宜，而组织极易撕裂的舌组织缝合时，边距和针距均应增至5mm以上。
- 4.创口原位缝合用于无组织缺损，整齐、无张力的创口复位缝合。创口原位缝合包括单纯缝合、外翻缝合、皮内缝合。
- 5.单纯缝合分为间断缝合和连续缝合两种。肌肉、筋膜、皮肤等以间断缝合为主。连续缝合又可分为单纯连续缝合和连续锁边缝合，连续缝合的优点是速度快，缺点是可能发生断线引起的缝线松脱，且创口对位较差。



扫码并关注
获取更全面的医考资讯