

医学考试必考


口腔 每日知识点

第四部分口腔临床医学综合

口腔颌面外科学



- 1.普鲁卡因不适用于表面麻醉，又因其麻醉作用时间较短，一次最大剂量（成人）为800~1000mg。
- 2.利多卡因又名赛洛卡因，对心律失常病员常作为首选的局部麻醉药。本品毒性较普鲁卡因大，用作局麻时，一次最大用量为300~400mg，使用时应分次小量注射。
- 3.布比卡因又名丁呱卡因，持续时间为利多卡因的2倍，一般可达6小时以上，麻醉强度为利多卡因的3~4倍。
- 4.丁卡因又名地卡因，穿透力强。临床上主要用作表面麻醉。毒性较普鲁卡因大10~20倍。由于毒性大，一般不作浸润麻醉，一次使用量不应超过40~60mg，即2%丁卡因不超过2ml。
- 5.阿替卡因又名碧蓝麻，适用于成人及4岁以上儿童。
- 6.肾上腺素的作用是延缓吸收，加强镇痛效果，延长局麻时间，降低毒性反应，以及减少术区出血，使术野清晰。
- 7.上牙槽后神经阻滞麻醉又称上颌结节注射法。口内注射一般以上颌第二磨牙远中颊侧根部前庭沟作为进针点，注射针与上颌牙的长轴成40°，向上后内方刺入，注意针尖刺入不宜过深，以免刺破上颌结节后方的翼静脉丛，引起血肿。



扫码并关注
获取更全面的医考资讯